

LES CIVE D'HIVER

Les CIVE d'hiver sont semées à l'automne. Si leur productivité est la plus sûre, elles n'en sont pas moins bouleversantes pour le système de culture...

MÉTHODE

Objectif

- Tester la productivité des CIVE d'hiver dans notre contexte régional (climat, rotations...)
- Adapter l'itinéraire technique de cette CIVE au contexte de la méthanisation (récolte)
- Évaluer le potentiel des différentes variétés de seigle

Description

- 24 sites d'expérimentations sur 3 ans
- 137 modalités mesurées à 2 dates différentes
- 2 sites irrigués
- Les essais étaient conduits en bandes, en parcelles agriculteurs

POINTS-CLÉS

- Les CIVE d'hiver sont un bon levier pour garantir l'autonomie du méthaniseur, avec une productivité moyenne de 21 T brute /ha (5 T MS/ha), pour une récolte moyenne au 28 avril !
- Peu de différences entre les catégories de CIVE d'hiver : s'intéresser plus au taux de matière sèche à la récolte
- Plus la CIVE est récoltée tard, plus le rendement est élevé. Attention, au risque de verse à maturité.
- Ne pas pénaliser la productivité de la culture principale suivante par une récolte trop tardive !

**Des écart très visuels
entre les différentes variétés
de seigle en sortie d'hiver**



Photo Chambre d'agriculture du Puy de Dôme, 11/04/2022

Partenaires :



RÉSULTATS

Rendement moyen des CIVE d'hiver suivant le stade de récolte.



**Le seigle reste
la céréale d'hiver
la plus utilisée
en CIVE d'hiver**

Financé par :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité



tech&bio

Une initiative
Chambres
d'agriculture

